


Informationsblatt Nr. 4

Kommunikation über sexuell übertragbare Infektionen (STI)

»Haben Sie vor dem ersten Sex mit Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin über HIV/AIDS und andere sexuell übertragbare Infektionen gesprochen?«


(Männer und Frauen in festen Beziehungen, nach Alter und Geschlecht, in %)



Weniger als die Hälfte der Menschen in festen Beziehungen spricht mit dem Partner/der Partnerin über STI bevor sie gemeinsam sexuell aktiv werden. Der Vergleich der Altersgruppen zeigt deutliche Unterschiede: Während von den heute 66- bis 75-Jährigen nur 9% vor ihrer ersten sexuellen Erfahrung mit einem neuen Partner/einer neuen Partnerin über STI gesprochen haben, sind es bei den heute 18- bis 25-Jährigen mehr als 40%. Heterosexuelle Paare thematisieren dies seltener als lesbische, schwule und bisexuelle Paare.

»Haben Sie vor dem ersten Sex mit Ihrem Partner/ Ihrer Partnerin über den Gebrauch von Kondomen gesprochen?«

(Männer und Frauen in festen Beziehungen, nach Alter und Geschlecht, in %)



Über Kondome zu sprechen, bevor man mit einem Partner oder einer Partnerin sexuell aktiv wird, ist selbstverständlicher, als über sexuell übertragbare Infektionen (STI) zu sprechen. In der jüngsten Altersgruppe der 18- bis 25-Jährigen haben dies drei Viertel aller Männer und Frauen getan. Im Vergleich der Altersgruppen wird deutlich, dass die jüngeren Altersgruppen häufiger über den Gebrauch von Kondomen sprechen.

