

Informationsblatt

Nr. 5

Bekanntheit verschiedener sexuell übertragbarer Infektionen (STI) - ungestützte Abfrage

»Welche sexuell übertragbaren Erkrankungen/Infektionen kennen Sie?
 Bitte schreiben Sie alle auf, die Ihnen einfallen.«

(Anteil der Nennungen verschiedener STI, nach Geschlecht, in %)

	Männer	Frauen	Gesamt
HIV/AIDS	71,1	71,1	71,1
Gonorrhö/Tripper	43,9	33,3	38,6
Syphilis	31,6	32,3	31,9
Chlamydien	7,8	15,6	11,7
Genitaler Herpes	9,7	11,5	10,6
Hepatitis B	10,5	10,0	10,3
Genitalwarzen	3,8	4,9	4,4
Schamhaarläuse/ Filzläuse	2,7	2,8	2,8
Trichomonaden	0,2	0,6	0,4

Von den neun untersuchten STI war HIV/AIDS mit großem Abstand den meisten Befragten bekannt: 71,1 % aller Befragten konnten HIV/AIDS in der ungestützten Abfrage nennen. In der Rangfolge der Bekanntheit in der ungestützten Abfrage waren die drei am häufigsten genannten STI: HIV/AIDS (71,1 %), Gonorrhö/Tripper (38,6 %) und Syphilis (31,9 %). Die drei am wenigsten bekannten waren Trichomonaden (0,4 %), Schamhaarläuse/Filzläuse (2,8 %) und Genitalwarzen (4,4 %).

Geschlechterunterschiede in Bezug auf die Bekanntheit fanden sich in der ungestützten Abfrage nur bei Chlamydien: Diese waren Frauen (15,6 %) deutlich häufiger bekannt als Männern (7,8 %); und Gonorrhö: Diese war Männern (43,9 %) häufiger bekannt als Frauen (33,3 %).