


Informationsblatt Nr. 6

Bekanntheit verschiedener sexuell übertragbarer Infektionen (STI) nach Altersgruppen

»Welche sexuell übertragbaren Erkrankungen/Infektionen kennen Sie?
Bitte schreiben Sie alle auf, die Ihnen einfallen.«

(Anteil der Nennungen verschiedener STI, nach Altersgruppen, in %)



Das Alter hat einen signifikanten Einfluss auf die Informiertheit über sexuell übertragbare Infektionen (STI): Grundsätzlich zeigen sich die jüngeren Altersgruppen (18- bis 35-Jährige) in Bezug auf viele STI deutlich besser informiert als ältere Menschen. So konnten ca. 20 % der 18- bis 35-Jährigen Chlamydien spontan nennen, bei den 66- bis 75-Jährigen waren es nur 3 %.

Eine Ausnahme von diesem Trend bilden Syphilis und Gonorrhö/Tripper. Bezogen auf diese beiden STI zeigen sich die Altersgruppen ab 46 Jahren ebenso gut oder sogar leicht besser informiert als die jüngeren.

Im Hinblick auf den Einfluss des Alters kann positiv vermerkt werden, dass bei den jüngeren Befragten (18-35 Jahre) die Bekanntheit der verschiedenen STI insgesamt höher ist. Dies hängt vermutlich damit zusammen, dass für die jüngeren Jahrgänge einerseits sexuelle Bildungs- und Aufklärungsangebote in der Schule weiter verbreitet waren und andererseits im Rahmen der schulischen Sexualaufklärung auch häufiger über STI gesprochen wurde.