


Informationsblatt Nr. 8

Kondomnutzung beim Sex außerhalb von festen Beziehungen



»Wie häufig haben Sie in den letzten 12 Monaten beim Sex ein Kondom verwendet?«

(Personen, die aktuell Single sind oder Sex außerhalb ihrer festen Beziehung hatten, nach Geschlecht, in %)

Singlephase



Außerhalb der Beziehung



Die Verwendung von Kondomen schützt vor HIV und senkt das Risiko, sich mit einer anderen sexuell übertragbaren Infektion anzustecken. 78 % der männlichen und 74 % der weiblichen Singles sowie 56 % der Personen, die Sex außerhalb ihrer Beziehung hatten, haben im vergangenen Jahr zumindest manchmal Kondome genutzt. 22 % der männlichen und 26 % der weiblichen Singles sowie ein relativ hoher Anteil der Personen, die Sex außerhalb ihrer Beziehung hatten (44 % der Männer und 44 % der Frauen), haben im vergangenen Jahr allerdings keine Kondome verwendet.

Gründe für Kondomverzicht

»Warum haben Sie auf ein Kondom verzichtet?«

(Personen, die aktuell Single sind oder Sex außerhalb ihrer festen Beziehung hatten, nach Geschlecht, in %; Mehrfachnennung möglich)

Gründe für Kondomverzicht (beim letzten Mal)	Singlephase			Außerhalb der Beziehung		
	Männer	Frauen	Gesamt	Männer	Frauen	Gesamt
Ich war sicher, dass wir beide gesund sind	53%	71%	62%	49%	55%	51%
Sex mit Kondom ist weniger lustvoll	40%	19%	30%	23%	21%	23%
Bei der Kondomnutzung Probleme, eine Erektion aufrechtzuerhalten	14%	7%	11%	9%	4%	8%
Alkohol-/Drogeneinfluss	12%	10%	11%	1%	4%	2%
Es war kein Kondom verfügbar	10%	9%	10%	10%	12%	11%
Mein Sexualpartner/meine Sexualpartnerin wollte kein Kondom benutzen	7%	6%	7%	16%	3%	13%

Männer und Frauen, die ohne Kondom sexuell aktiv sind, sind sich häufig sicher, dass der Sexualpartner bzw. die Sexualpartnerin gesund ist und daher kein Ansteckungsrisiko besteht. Möglicherweise wird die Gefahr einer STI-Übertragung in sexuellen Risikosituationen manchmal ausgeblendet. Dass Sex mit Kondom weniger lustvoll sei, ist bei Singlemännern das zweithäufigste Argument dafür, kein Kondom zu nutzen. Alkohol- und Drogenkonsum oder mangelnde Verfügbarkeit eines Kondoms spielen dagegen nur eine untergeordnete Rolle.