


# Informationsblatt Nr. 7

## Sprechen über STI mit einem Arzt oder einer Ärztin

»Haben Sie jemals mit einem Arzt oder einer Ärztin über HIV/AIDS oder andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) gesprochen oder hatten Sie den Wunsch danach?«

(nach Altersgruppen und Geschlecht, in %)



Nur eine Minderheit von Personen hat jemals mit einem Arzt oder einer Ärztin über HIV/AIDS oder andere sexuell übertragbare Infektionen (STI) gesprochen. Für insgesamt 31 % der Frauen und 21 % der Männer waren sexuell übertragbare Infektionen (STI) schon einmal Bestandteil eines ärztlichen Beratungsgesprächs. Weitere 15 % der Frauen und 17 % der Männer würden gerne mit ihrem Arzt/ihrer Ärztin darüber sprechen, die anderen haben keinen Wunsch danach. Jüngere Menschen sprechen häufiger als ältere und Frauen häufiger als Männer mit ihrem Arzt oder ihrer Ärztin über STI. Junge Frauen bis 35 Jahre haben am häufigsten den Wunsch nach mehr ärztlicher Beratung.

## Sprechen über STI mit dem Sexualpartner/der Sexualpartnerin im Falle einer Erkrankung

»Haben Sie über Ihre Erkrankung damals mit Ihrem Sexualpartner/Ihrer Sexualpartnerin gesprochen?«

(Anteil der Ja-Antworten, nach Geschlecht, in %)

	Männer		Frauen	
	Lebenszeitprävalenz (jemals erkrankt)	Davon damals mit Partner/-in gesprochen	Lebenszeitprävalenz (jemals erkrankt)	Davon damals mit Partner/-in gesprochen
Chlamydien	1,6	84,2	5,8	87,2
Gonorrhö/Tripper	2,3	69,6	1,4	81,3
Genitalwarzen	1,6	80,6	2,2	72,5
Schamhaarläuse/Filzläuse	1,3	78,3	1,3	70,4
Genitaler Herpes	0,7	91,7	1,7	87,5

Einige STI wie z. B. Chlamydien sind weitverbreitet. Jeder Mensch, der sexuell aktiv ist, kann sich in seiner Lebensspanne mit einer STI anstecken. Es zeigt sich bei der großen Mehrheit der Befragten ein verantwortungsvolles Kommunikationsverhalten: Zwischen 70,4 % und 87,5 % derjenigen, die schon jemals eine STI hatten, haben zum damaligen Zeitpunkt mit ihren Sexualpartnern/Sexualpartnerinnen darüber gesprochen.